

«СОГЛАСОВАНО»

Директор

ФБУН НИИ Дезинфектологии

Роспотребнадзора

д.м.н., профессор



Н.В. Шестопалов

«17» декабря

2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Мератекх Рус Групп»

А.Н. Новиков

«  »    2014 г..

ИНСТРУКЦИЯ № 2/14  
по применению дезинфицирующего средства (кожного антисептика) –  
мыла с дезинфицирующим эффектом «МЕРАГЕЛЬ Сэпто Дерм»  
(MERAGEL Septo Derm)»

Москва, 2014г.

## **Инструкция №2/14**

по применению дезинфицирующего средства (кожного антисептика) –  
мыло с дезинфицирующим эффектом «МЕРАГЕЛЬ Сэпто Дерм (MERAGEL  
Septo Derm)».

Инструкция разработана в ФБУН Научно-исследовательский институт Дезинфектологии  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека

Авторы: Шестопалова Т.Н., Потапова Т.Н.

### **1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1. Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) – мыло с дезинфицирующим эффектом «МЕРАГЕЛЬ Сэпто Дерм (MERAGEL SeptoDerm)» представляет собой готовое к применению средство в виде прозрачной вязкой бесцветной жидкости с характерным запахом отдушки. Средство содержит в своем составе полигексаметиленбигуанид гидрохлорид (0,96 +0,11%) в качестве действующего вещества, а также вспомогательные компоненты.

Средство выпускается во флаконах и канистрах из полимерных материалов вместимостью 500 мл, 1л, 5л с плотно завинчивающимися крышками. Гарантийный срок годности средства в невскрытой упаковке производителя – 2 года с даты изготовления.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), дрожжеподобных грибов рода Кандида.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по классификации ГОСТ 12.1.007-76, не обладает раздражающим действием на кожу; не оказывает кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего эффекта, оказывает слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаз.

ПДК полигексаметиленгуанидин гидрохлорид(ПГМГ) в воздухе рабочей зоны - 2 мг/м<sup>3</sup> (аэрозоль, 3 класс опасности).

1.4. Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) – мыло с дезинфицирующим эффектом «МЕРАГЕЛЬ Сэпто Дерм (MERAGEL SeptoDerm)» предназначено для гигиенической обработки рук:

- медицинского персонала медицинских организаций любого профиля (больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, медсанчасти и медпункты, фельдшерские и

- фельдшерско-акушерские пункты, диспансеры, госпитали, стоматологические кабинеты, родовспомогательных учреждения);
- работников лабораторий (в том числе бактериологических, иммунологических, клинических и др.);
  - работников аптек и аптечных заведений;
  - работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений социального обеспечения и социальной защиты (хосписы, дома-интернаты для инвалидов и лиц пожилого возраста, приюты и пр.), санаторно-курортных учреждений, пенитенциарных и воинских учреждений;
  - работников парфюмерно-косметических, химико-фармацевтических, биотехнологических, микробиологических предприятий;
  - работников предприятий пищевой промышленности, общественного питания, продовольственных и промышленных рынков, торговли (в том числе кассиров и других лиц, работающих с денежными купюрами), коммунально-бытовых объектов (косметических салонов, парикмахерских, салонов красоты, соляриев, гостиниц, прачечных);
  - работников учреждений образования, культуры, отдыха, спорта;
  - взрослым населением в быту.

## 2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

Нанести 3 мл средства на влажные руки, намылить и образовавшейся пеной в течение 1 минуты обрабатывать руки, обращая внимание на тщательность обработки кожи между пальцами и кончиков пальцев. Затем средство смыть проточной водопроводной водой.

## 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 3.1. Средство использовать только для наружного применения в соответствии с настоящей инструкцией.
- 3.2. Не обрабатывать раны и слизистые оболочки глаз!
- 3.3. Не использовать средство по истечении срока годности.
- 3.4. Хранить отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

## 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- 4.1. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть под струей воды. При необходимости обратиться к окулисту.
- 4.2. При проглатывании средства выпить стакан воды с таблетками измельченного активированного угля.

4.3. При попадании средства на поврежденные участки кожи необходимо промыть их водой.

## 5. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Хранить средство в упаковке изготовителя в крытом сухом складском помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла.

5.2. В аварийной ситуации при нарушении целостности потребительской упаковки средства засыпать впитывающим материалом (песком, силикагелем или другим негорючими материалом), собрать и отправить на утилизацию. Работы проводить в резиновых перчатках.

5.3. Транспортировка средства допускается всеми видами наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

5.4. Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.