

«СОГЛАСОВАНО»

Директор

ФБУН НИИ Дезинфектологии

Роспотребнадзора

д.м.н., профессор



Н.В. Нестопалов

« 24 » 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Эколаб»

В. Харант

«\_\_\_» 2015г.

ИНСТРУКЦИЯ № EL85C-2015  
по применению средства дезинфицирующего  
(кожный антисептик) - жидкого мыла «PureHand EL 85C»

Москва, 2015 г.

**Инструкция № EL85C-2015**  
по применению средства дезинфицирующего  
(кожный антисептик) - жидкого мыла «PureHand EL 85C».

Инструкция разработана в ФБУН НИИДезинфектологии  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Авторы: Шестопалова Т.Н., Потапова Т.Н., Андреев С.В.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство представляет собой готовое к применению жидкое мыло в виде прозрачной жидкости от бесцветной до бледно-желтой со специфическим запахом. Средство содержит в своем составе дидецилдиметиламмоний хлорид (0,9%), хлоргексидин диглюконат (0,9%) в качестве действующих веществ, а также вспомогательные компоненты.

Средство выпускается во флаконах из полимерного материала вместимостью 500 мл, канистрах из полимерного материала вместимостью 5,0 л. Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре от 0<sup>0</sup>С до 50<sup>0</sup>С составляет 36 месяцев с даты изготовления.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), грибов рода Кандида.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по классификации ГОСТ 12.1.007-76, пары мало опасны – 4 класс по Классификации химических веществ по степени летучести, не обладает раздражающим действием на кожу,ожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием, вызывает раздражение слизистых оболочек глаз.

ПДК дидецилдиметиламмоний хлорида в воздухе рабочей зоны - 1 мг/м<sup>3</sup> (аэрозоль, 2 класс опасности).

1.4. Средство предназначено для:

*гигиенической обработки рук:*

- медицинского персонала медицинских организаций;
- медицинских работников учреждений социального обеспечения и социальной защиты (хосписы, дома-интернаты для инвалидов и лиц пожилого возраста, приюты и пр.);
- медицинских работников воинских частей и воинских учреждений;
- персонала санаторно-курортных учреждений;
- работников детских образовательных учреждений;

- работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (по переработке молока и производству молочных продуктов, масложировой, мясной, рыбоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской, пивобезалкогольной, по производству напитков, соков, соусов и пр.);
- работников парфюмерно-косметических, химико-фармацевтических, биотехнологических предприятий;
- работников предприятий общественного питания (столовые, кафе, бары, рестораны, предприятия быстрого питания, профессиональные кухни торговых и развлекательных комплексов и пр.);
- работников продовольственных и промышленных рынков, торговли (в том числе кассиров и других лиц, работающих с денежными купюрами);
- работников коммунально-бытовых объектов (косметических салонов, парикмахерских, салонов красоты, соляриев, гостиниц, прачечных и пр.).
- работников учреждений образования, культуры, отдыха, спорта.

Средство предназначено также для *санитарной обработки кожных покровов* пациентов в медицинских организациях.

## 2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. *Гигиеническая обработка рук*: нанести 2 мл средства на влажные руки, намылить и образовавшейся пеной в течение 1 минуты обрабатывать руки, обращая внимание на тщательность обработки кожи между пальцами и кончиков пальцев, после чего смыть средство большим количеством проточной водопроводной воды.

2.2 *Санитарная обработка кожных покровов*: нанести необходимое количество средства на влажную мочалку и с ее помощью намылить увлажненную кожу; образовавшейся пеной в течение 1 минуты обрабатывать кожные покровы, избегая попадания средства в глаза, после чего смыть средство большим количеством проточной водопроводной воды.

## 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Средство использовать только для наружного применения в соответствии с инструкцией по применению.

3.2. Не использовать по истечении срока годности.

3.3. Не обрабатывать раны и слизистые оболочки глаз.

3.4. Хранить отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.

#### 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При попадании средства в глаза их следует обильно промыть под струей воды и закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

4.2. При проглатывании выпить стакан воды с 10 таблетками измельченного активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

4.3. При попадании средства на поврежденные участки кожи необходимо промыть их теплой водой.

#### 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортировка средства допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

5.2. Хранить средство в упаковке изготовителя в крытом сухом складском помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0<sup>0</sup>C до 50<sup>0</sup>C.

5.3. В аварийной ситуации при нарушении целостности потребительской упаковки средства засыпать впитывающим материалом (песком, силикагелем или другим негорючими материалом), собрать и отправить на утилизацию. Остатки средства смыть водой. Работы проводить в резиновых перчатках и очках.

5.4. Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.